

La Zona

A safe space in Tijuana, Mexico.

Coord. Alfonso Chavez.

alfonso@prevenCasa.org




La Zona



Starting from 2004.

The community-based NGO is located in the city's "tolerance zone" (Tijuana, Mexico).

The ZONA NORTE is characterized by housing many populations in vulnerable contexts, deported people, homeless, substance use in public places, migrant shelters, sex work, drug tourism, etc.



- The northern border of Mexico has very particular social dynamics: Consumption practices.
- "El Chaparral" - The busiest border crossing in the world with more than 30 million crossings per year, according to (SRE).



Migration flows, population mobility & humanitarian crisis.

- 2016 / Haitian community.
- 2018 / Central American community.
- 2022 / Ukrainian community.



Fuente: El Bordo, Tijuana, Baja California. Alfonso Caraveo. Noviembre 2018.

"The happiest place on earth."

Drug tourism.

Sex tourism.



PrevenCasa A.C.



Harm Reduction Program

- Safe supplies (syringes/pipes/aluminum foil).
- Primary medical and psychological care.
- HIV, syphilis, and HCV testing.
- Wound clinic.
- Access to prevention information and other services (documentation).
- Potable water/showers.
- Community workshops (human rights/self-care/overdose prevention).
- Veterinary care for community pets.





The introduction of fentanyl and its impacts on the community.

- The community identified the presence of fentanyl as early as 2017–2018.
- There is no official data on overdose deaths.
- Increased public security presence: National Guard, Army, and municipal police.
- More reports of human rights abuses: social "cleansings" and enforced disappearances.
- People remain deeply alienated from institutions.
- Frequent interruptions to methadone.
- Under-reporting, alongside over 900 overdose cases treated in two years.
- The local drug market continues to change; more cuts = more risks.
- There are no community naloxone distribution programs.

Focus group

Risk assessment with women who inject drugs.

Issues associated with street-based substance use, and challenges and strategies for a Supervised Consumption Service (SCS) in the city.

Additional services at the community center.

Logo / nombre /
materiales de promoción

- La capilla.
- El bordito.
- La zona.
- Tu "cura"
Segura.







A site characterized by dynamics of spatial reconfiguration and reorganization.

Adaptación del espacio, 2022

Hugo - Luis - Carlos - Manuel



More than a year to adapt the space.



PrevenCasa A.C.



¡TENEMOS SERVICIOS ESPECIALES PARA TI!

- CONSULTA MÉDICA
- CONSULTA PSICOLÓGICA
- CONSULTA NUTRICIONAL
- PRUEBAS RÁPIDAS (VIH/SIFILIS)
- PLANES DE VIDA PERSONAL
- PLANES DE PREVENCIÓN
- CURACIÓN DE HERIDAS Y ABSCESES
- REGADERAS COMUNITARIAS
- ZONA SEGURA

¡TEL. 011 55 52 00 00 00!
VISITANOS DE LUNES A VIERNES, 9 A.M. A 1 P.M.


PrevenCasa A.C.
Calle Boja California #7580, Zona Norte
Tijuana, Baja California



Injection site



Smoking area



PrevenCasa A.C.

- Rest area.
- Recreation area.
- Personal belongings storage area.
- Wound/abscess/injury cleaning area.
- Communal grooming area.
- Movie screenings (Fridays).
- Workshops on overdose prevention, human rights, and self-care.
- Overdose response kits / Naloxone.
- Adulterant, fentanyl, and methamphetamine test strips.
- Rapid HIV, HCV, and syphilis testing.
- Personal hygiene.

Linkage to other health services within the organization:

- Showers.
- Primary medical consultation.
- Psychological consultation.



Respondiendo a sobredosis por opiáceos



Llama al 911
Aplica naloxona
Permanece a su lado

Señales de una sobredosis por opiáceos

Los opiáceos disminuyen el ritmo respiratorio y la conciencia. Algunos son: heroína, codeína, morfina, metadona, buprenorfina y otros.



El consumo de las drogas, legal o no, representa un riesgo constante a nuestra salud. No todas las sustancias de abuso presentan los mismos síntomas (por ejemplo, algunas pueden experimentar una apertura de la pupila, lo contrario a lo que ocurre con la heroína). En caso de duda, una naloxona NO causará ningún efecto o mal si no está presente.

SÁLVAME Pasos para atender una sobredosis



Continúa dando naloxona. Si el paciente no responde, continúa dando la droga. Si el paciente responde, continúa dando la droga. Si el paciente responde, continúa dando la droga.

Consejos para un consumo seguro

Intenta usar con el menor consumo posible.

Empieza con poca, no despiques. Evita mezclar con otras drogas. Evita usar una pequeña cantidad primera. El drogón cae cuando se usa mucho de lo que tiene, especialmente si es un "buddy" nuevo.

Procura no mezclar sustancias. Evita el consumo de alcohol. Algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sobredosis como, por ejemplo, los benzodiazepinas.


Evita usar drogas cuando tengas problemas de salud o no hayas dado con un "buddy", por ejemplo, o si recientemente saliste de prisión o del hospital, o si no sabes de qué.

Si tienes que dejar a la persona, continúa dando la droga. Si el paciente responde, continúa dando la droga. Si el paciente responde, continúa dando la droga.

Si tienes que dejar a la persona, continúa dando la droga. Si el paciente responde, continúa dando la droga. Si el paciente responde, continúa dando la droga.

Si tienes que dejar a la persona, continúa dando la droga. Si el paciente responde, continúa dando la droga. Si el paciente responde, continúa dando la droga.

¿CÓMO PREPARAR TU PIPA CON CRISTAL (METH)?



Una vez que empieces a inhalar, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir.

Una vez que empieces a inhalar, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir.

Una vez que empieces a inhalar, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir.

Una vez que empieces a inhalar, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir.

Una vez que empieces a inhalar, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir.

Una vez que empieces a inhalar, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir.

Una vez que empieces a inhalar, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir.

Una vez que empieces a inhalar, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir. Si no inhalas, el vapor se va a ir.

NO USES SOLO/A. CARGA HALOXONA. CÚMPLATE Y CÚMPLA A LOS DEMÁS.

Las sobredosis fatales no son comunes con el uso de estimulantes, sin embargo, el uso de las drogas con otros sustancias puede aumentar el "mal viaje" o una sobredosis fatal. Una sobredosis puede ser fatal si no hay. Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

'MAL VIAJE' / 'MAL TRIP' / SOBREDOSIS

Las sobredosis fatales no son comunes con el uso de estimulantes, sin embargo, el uso de las drogas con otros sustancias puede aumentar el "mal viaje" o una sobredosis fatal. Una sobredosis puede ser fatal si no hay. Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Sobredosis Señales de una sobredosis (OD)

Las sobredosis fatales no son comunes con el uso de estimulantes, sin embargo, el uso de las drogas con otros sustancias puede aumentar el "mal viaje" o una sobredosis fatal. Una sobredosis puede ser fatal si no hay. Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

FUMANDO CRISTAL 'METH'

Las sobredosis fatales no son comunes con el uso de estimulantes, sin embargo, el uso de las drogas con otros sustancias puede aumentar el "mal viaje" o una sobredosis fatal. Una sobredosis puede ser fatal si no hay. Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

TESTEA TU SUSTANCIA FENTANILO

Las sobredosis fatales no son comunes con el uso de estimulantes, sin embargo, el uso de las drogas con otros sustancias puede aumentar el "mal viaje" o una sobredosis fatal. Una sobredosis puede ser fatal si no hay. Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Este medicamento es para ayudar a identificar cuándo una persona está teniendo un "mal viaje" o una sobredosis y requiere un diagnóstico o supervisión médica de emergencia.

Si la sustancia analizada es un estimulante (cocaína) y la prueba es positiva, agrega otros 30 ml de agua al vaso y prueba nuevamente con una muestra fría.

Las concentraciones elevadas de estimulantes pueden dar falsos positivos.

Un resultado negativo, no significa que la sustancia es segura. Las tiras reactivas de fentanilo no son 100% precisas. Además, el fentanilo es sólo una de muchas drogas que pueden causar una sobredosis.

Las tiras reactivas para detectar fentanilo sólo verifican si el fentanilo está presente en la muestra analizada. No comprueban qué cantidad o qué tan fuerte sea la sustancia.

Una línea significa POSITIVO para fentanilo.

Dois líneas significan NEGATIVO, aunque la línea sea tenue.

Una línea significa POSITIVO para fentanilo.

Dois líneas significan NEGATIVO, aunque la línea sea tenue.

Una línea significa POSITIVO para fentanilo.

Dois líneas significan NEGATIVO, aunque la línea sea tenue.

Una línea significa POSITIVO para fentanilo.

Dois líneas significan NEGATIVO, aunque la línea sea tenue.

INVÁLIDO si no marca ninguno de las dos líneas, o sólo la "T".



Si tienes que dejar a la persona sola, notifica en posición de recuperación.

Si tienes que dejar a la persona sola, notifica en posición de recuperación.

Si tienes que dejar a la persona sola, notifica en posición de recuperación.

La naloxona revierte una sobredosis de opiáceos. No revierte un "mal viaje" o una sobredosis de estimulantes, pero sí revierte un "mal viaje" o una sobredosis de opiáceos.

La naloxona revierte una sobredosis de opiáceos. No revierte un "mal viaje" o una sobredosis de estimulantes, pero sí revierte un "mal viaje" o una sobredosis de opiáceos.

La naloxona revierte una sobredosis de opiáceos. No revierte un "mal viaje" o una sobredosis de estimulantes, pero sí revierte un "mal viaje" o una sobredosis de opiáceos.

La naloxona revierte una sobredosis de opiáceos. No revierte un "mal viaje" o una sobredosis de estimulantes, pero sí revierte un "mal viaje" o una sobredosis de opiáceos.

La naloxona revierte una sobredosis de opiáceos. No revierte un "mal viaje" o una sobredosis de estimulantes, pero sí revierte un "mal viaje" o una sobredosis de opiáceos.

La naloxona revierte una sobredosis de opiáceos. No revierte un "mal viaje" o una sobredosis de estimulantes, pero sí revierte un "mal viaje" o una sobredosis de opiáceos.

La naloxona revierte una sobredosis de opiáceos. No revierte un "mal viaje" o una sobredosis de estimulantes, pero sí revierte un "mal viaje" o una sobredosis de opiáceos.

La naloxona revierte una sobredosis de opiáceos. No revierte un "mal viaje" o una sobredosis de estimulantes, pero sí revierte un "mal viaje" o una sobredosis de opiáceos.

3 years...

+ 2500 interventions.
+ 350 different people.


% 85 women..

% 5 Trans.

% 59 Injection.

% 40 Smoke.

0 deaths.





- People aren't necessarily consuming substances while in the space.
- They come to rest and/or sleep.
- To listen to music.
- To put on makeup.
- There is a need for self-expression.
- Conversations take place that they can't have on the street: drugs, self-care, violence, sex work, police abuse.
- "Me agarre a la primera"....



PrevenCasa A.C.

Some challenges for community- based NGOs in Mexico.

- Funding for frontline organizations.
- Mexico's northern border has dynamics distinct from the rest of the country, characterized by high levels of violence.
- Policies grounded in human rights.
- Moving from narrative to practice.

